

# ATRIAS DE TABACO

Nº 5: 23 / JUNIO / 2015



## MOHO AZUL

Se ha **detectado ataque de moho azul** en varias parcelas próximas al Río Tiétar.

Por tanto se recomienda **vigilar cuidadosamente** las plantaciones y **tratar inmediatamente si se ven síntomas**, o incluso tratar parcelas sin ataque inicial pero próximas a parcelas afectadas o situadas en zonas más sensibles al desarrollo del moho.

Los productos que se pueden utilizar son los siguientes:

Materia activa	Nombre comercial	Actividad	Dosis	Plazo seguridad	Toxicol. (Hombre, Medio ambiente)
benalaxil 8% + mancozeb 65% WP	GALBEN M	Sistémico+contacto Prev/curativo	0.2-0.3%	30 días	Xn N
mancozeb 35%SC, 75%WG y 80%WP	Varios	Contacto Preventivo	Según concentración	15-28 días	Xn N
metalaxil 8% + mancozeb 64% WP	Varios	Sistémico+contacto Prev/curativo	0.2-0.3%	21 días	Xn 0/N
metalaxil M 3.9% + mancozeb 64% WP	RIDOMIL Gold MZ	Sistémico+contacto Prev/curativo	0.2-0.3%	21 días	Xn N
metalaxil 25% WP	Varios	Contacto Preventivo	0,08-0,12%	21 días	Xi/Xn 0

